

# 頭を打った



意識がない

意識はある

- 打った部位がへこんでいる
- 出血が止まらない
- けいれんがある
- 何度も吐く
- ぐったりしている

1つ以上あてはまる

救急車を呼ぶ



119

かかりつけ医、または  
救急医療機関を受診する

- 泣き出すまで数10秒かかった
- 顔が悪く、吐き気や嘔吐がある
- 出血している
- 大人の親指以上のたんこぶがある
- ぶよぶよと腫れてきた
- 打ったあと鼻水が出て止まらない
- 普段と様子が違う

1つ以上  
あてはまる

1つも  
あてはまらない

症状が悪く  
なるようなら

家庭で  
様子を見る

## ●観察のポイント

- 48時間は様子を見てください。
- 意識はどうですか
- ボーっとしていませんか
- 転びやすくなっていませんか
- 吐き気、嘔吐はないですか
- けいれんはないですか
- 普段と様子が違うところはありませんか

## ●家庭でできること

- こぶができた場合、濡らしたタオルなどで冷やして様子を見てください。
- 出血していたら、乾いたきれいなタオルで強く圧迫して止血してください。
- すぐに泣いて他に症状がなくても、少なくとも48時間は顔色、機嫌、おう吐、歩き方など様子を見ましょう。



## お医者さんに伝えてほしいこと

- 頭を打った原因  
転落、転倒、ぶつけたなど
- 落ちた場所、転んだ場所はどこか  
落ちた時の高さ